

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата
РЕГЛИСАМ

Внимательно прочтайте эту инструкцию перед тем, как начать прием / использование этого лекарства.

Это лекарство отпускается без рецепта. Для достижения оптимальных результатов его следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции.

- Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.
- Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.

Регистрационный номер: ЛС-000501

Торговое название: Реглисам

Международное непатентованное

или группировочное наименование: Аммония глицирризинат

Лекарственная форма: таблетки

Состав на одну таблетку

Активное вещество

Глицирам (Аммония глицирризинат)
в пересчете на 100 % вещества – 0,05 г

Вспомогательные вещества

Натрия хлорид	– 0,100 г
Крахмал картофельный	– 0,008 г
Тальк	– 0,001 г
Кальция стеарат	– 0,001 г
Масса таблетки	– 0,16 г

Описание

Таблетки круглые, плоскоцилиндрической формы с фаской, от белого с желтоватым оттенком до желтого с коричневатым оттенком цвета с вкраплениями более темного цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Противовоспалительное средство.

Код ATX

[R07AX].

Фармакологические свойства

Оказывает противовоспалительное, умеренное отхаркивающее действие, стимулирует функцию коры надпочечников.

Показания к применению

В качестве отхаркивающего средства в составе комплексной терапии при заболеваниях дыхательных путей с трудно отделяемой мокротой (в том числе при легких формах бронхиальной астмы).

Экзема, аллергический дерматит, болезнь Адисона (диэнцефально-гипофизарные формы, как самостоятельно, так и в сочетании с адренокортикотропным гормоном), астенические состояния и гипотонический синдром, гипофункция коры надпочечников на фоне длительной терапии глюкокортикоидами, в том числе профилактика синдрома «отмены» в период прекращения лечения глюкокортикоидами или снижения их дозировки (в составе комплексной терапии).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелые органические поражения сердца и паренхиматозных органов, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 10 лет.

Способ применения и дозы

Внутрь, за 30 минут до еды или через 30 минут после еды. Взрослым и детям старше 10 лет — по 1–2 таблетки 2 раза в день. В более тяжелых случаях разовая доза препарата составляет 2 таблетки 3–6 раз в день. Длительность лечения — от 2 недель до 6 месяцев. Возможность повторных курсов, дозы препарата и длительность лечения определяются врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. При длительном применении в высоких дозах возможна задержка выведения воды из организма.

Передозировка

Возможно нарушение функций печени.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Возможно усиление действия препаратов, стимулирующих функцию коры надпочечников.

Особые указания

Применение препарата не влияет на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки 50 мг. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку, 5 или 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку с вкладышем из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель / Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Адрес местонахождения: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел./факс: (495) 716-15-81, 716-15-90.

Адрес места осуществления производства: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, корп. 84, корп. 87, зд. 90.